

Số: 495 /TTYT

Nhà Bè, ngày 03 tháng 8 năm 2022

V/v tăng cường giám sát phòng, chống
dịch bệnh đậu mùa khi trên địa bàn Thành phố
năm 2022.

K/c: *Chúy*

Đã tiếp nhận

05/8/2022

Kính gửi :

- UBND huyện Nhà Bè;
- Trung tâm Văn hóa huyện;
- Đài phát thanh huyện;
- Phòng Giáo dục – Đào tạo huyện;
- UBND xã, Thị.

Căn cứ công văn số 551/DP-DT ngày 25/5/2022 của Cục Y tế dự phòng về tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khi;

Căn cứ công văn số 5033/SYT- NVY ngày 25/7/2022 của Sở Y tế về tăng cường giám sát phòng, chống bệnh đậu mùa khi trên địa bàn Thành phố;

Theo thông tin từ Bộ Y tế, đến nay Việt Nam chưa ghi nhận trường hợp đậu mùa khi. Qua hệ thống giám sát của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Thành phố thì trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh vẫn chưa phát hiện trường hợp mắc bệnh đậu mùa khi và theo phân loại của Tổ chức Y tế thế giới, Việt Nam vẫn được xếp vào nhóm 1 (chưa có trường hợp xác định bệnh đậu mùa khi). Do đó, việc giám sát dịch bệnh tại các cửa khẩu, giám sát tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và giám sát dựa vào sự kiện tại cộng đồng để phát hiện sớm, ngăn chặn dịch bệnh kịp thời, đặc biệt lưu ý các trường hợp có tiền sử về từ vùng dịch, kịp thời phát hiện, truy vết, điều tra, quản lý ca bệnh và xử lý không để bệnh lây lan ra cộng đồng là nhiệm vụ cấp bách trong công tác phòng, chống dịch của ngành Y tế Thành phố.

Để chủ động phòng chống bệnh đậu mùa khi trên địa bàn Huyện, một trong các biện pháp quan trọng là tăng cường công tác truyền thanh trên tất cả phương tiện truyền thông đại chúng về Phòng chống bệnh đậu mùa khi để người dân hiểu và tự giác tham gia các hoạt động phòng chống dịch .

Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè đề nghị :

- UBND Huyện chỉ đạo các Phòng chức năng tăng cường công tác truyền thanh về Phòng chống bệnh Đậu mùa khi.

- Đài phát thanh huyện, xã thị tăng cường hỗ trợ phát thanh mỗi ngày 2 lần sáng, chiều (kể từ ngày 01/8/2022 đến 31/8/2022).

(Tài liệu đính kèm).

Trung tâm Y tế huyện Nhà Bè kính đề nghị UBND Huyện, Trung tâm Văn hóa huyện, Đài phát thanh huyện, UBND xã thị hỗ trợ đơn vị công tác truyền thanh phòng chống dịch bệnh./.

Nơi nhận :

- Như trên;
- Lưu VT.



BS. Trần Minh Hoàng

BỆNH ĐẬU MÙA KHÍ

1. Đậu mùa khí là gì?

Đậu mùa khí là một căn bệnh hiếm gặp, do virus có "họ hàng" với bệnh đậu mùa phổ biến. Đó là loại virus thuộc Orthopoxvirus gây ra.

2. Nguyên nhân gây bệnh đậu mùa khí

Theo các tài liệu, chủng virus gây bệnh đậu mùa khí thuộc chi Orthopoxvirus trong họ virus Poxviridae, lần đầu tiên được phát hiện vào năm 1958 ở hai ổ dịch giống với căn bệnh đậu mùa xảy ra ở khí trong phòng nghiên cứu nên căn bệnh này cũng được gọi là bệnh đậu mùa khí.

Tuy nhiên, cho đến thời điểm hiện tại bệnh đậu mùa khí chưa chắc chắn là tác nhân dẫn đến bùng phát dịch bệnh này. Theo WHO, nhiều khả năng loài gặm nhấm chính là nguồn lây lớn nhất, tuy vậy, vẫn chưa thể xác định một cách chính xác nguồn lây từ đâu, do đó đang phải chờ các nhà nghiên cứu.

3. Đường lây truyền bệnh đậu mùa khí

- Bệnh đậu mùa khí có thể lây trực tiếp khi tiếp xúc với máu, chất lỏng trong cơ thể, giọt bắn đường hô hấp, vết thương trên da hoặc niêm mạc của người bệnh (hoặc của động vật mắc bệnh).

- Ngoài ra, ăn thịt động vật bị nhiễm bệnh, tiếp xúc với các vật dụng của người bệnh (chăn ga gối đệm, khăn mặt, quần áo,...) hoặc tiếp xúc với các tổn thương da của người bệnh cũng có thể bị nhiễm bệnh đậu mùa khí.

- Căn bệnh này cũng có thể lây từ mẹ sang thai nhi và dẫn đến bệnh đậu mùa khí bẩm sinh và trẻ sơ sinh tiếp xúc gần với mẹ trong quá trình sinh nở và sau khi sinh cũng có nguy cơ nhiễm bệnh cao nếu mẹ đang mắc bệnh. Đáng lưu ý, tiếp xúc gần với người bệnh được xem như một yếu tố nguy cơ làm lây lan bệnh đậu mùa khí.

4. Dấu hiệu của bệnh đậu mùa khí

- Sốt (thường là triệu chứng bệnh đầu tiên), đau đầu dữ dội, đau mỏi lưng, các cơ, ớn lạnh, mệt mỏi uể oải, nổi hạch.

- Các nốt phát ban ban đầu chỉ hơi sần trên bề mặt da và sau đó phát triển nghiêm trọng hơn, trở thành mụn nước, sưng to rồi dần chuyển sang mụn mủ, sau đó khô lại, đóng vảy và xẹp xuống.

- Thông thường, các triệu chứng bệnh đậu mùa khỉ sẽ kéo dài từ 2 đến 4 tuần và tự khỏi, người bệnh không cần thực hiện các biện pháp điều trị đặc biệt.

5. Biến chứng do bệnh đậu mùa khỉ

Các biến chứng thường gặp của bệnh này như nhiễm trùng máu (có nguy cơ gây tử vong), viêm não, viêm phế quản phổi, nhiễm trùng giác mạc, mất thị lực. Đối với các vết thương trên da trở nên nghiêm trọng hơn khiến da bong ra thành từng mảng lớn.

6. Phòng ngừa bệnh đậu mùa khỉ

Tuy nước ta chưa có bệnh đậu mùa khỉ nhưng cần cách giác và tránh hoang mang lo sợ quá mức. Việc cảnh giác và phòng bệnh là hết sức cần thiết. Vì vậy, khi nghi ngờ bị bệnh cần nhanh chóng đến bệnh viện để được khám bệnh và cách ly.

- Cần thường xuyên thực hiện ăn chín, uống chín. Chỉ ăn thịt động vật rõ nguồn gốc xuất xứ, đã qua kiểm định.

- Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng với nước sạch hoặc sử dụng dung dịch vệ sinh tay có chứa cồn, đặc biệt là khi vừa tiếp xúc với người khác.

- Người nghi ngờ mắc bệnh đậu mùa khỉ cần được cách ly ngay lập tức và tránh tiếp xúc với người lành.